

# 計量経済 II：宿題 12

村澤 康友

提出期限：2024 年 1 月 22 日

**注意：**すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。授業の HP の解答例を正確に再現すること（乱数は除く）。グループで取り組んでよいが、個別に提出すること。解答例をコピーしたり、他人の名前で提出した場合は、提出点を 0 点とし、再提出も認めない。すべての結果をワードに貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可）、2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね、左上隅をホッチキスで留めること。

1. gretl で VECM を推定する手順は以下の通り。

- (a) メニューから「モデル」→「多変量時系列」→「ベクトル誤差修正モデル (VECM)」を選択。
- (b) 「ラグ次数」を入力。
- (c) 「ランク」を入力。
- (d) 「内生変数」を選択。
- (e) 「外生変数」は選択しない。
- (f) 定数項・トレンドの扱いを選択。
- (g) その他は必要に応じて設定（基本的にデフォルト値のままでよい）。
- (h) 「OK」をクリック。

gretl のサンプル・データ greenel1.3 は、1950～1985 年のアメリカのマクロの所得と消費の年次データである。この 2 変数の対数系列について、以下の分析を行いなさい。

- (a) VAR(4) モデル（定数項・トレンドあり）を推定しなさい。
- (b) ラグ次数 4, 共和分階数 1 の VECM（制約付きのトレンド）を推定しなさい。
- (c) 2 つのモデルのインパルス応答関数（点推定値と 95 %信頼区間）のグラフを比較しなさい。

2. gretl で Johansen の共和分検定を実行する手順は以下の通り。

- (a) メニューから「モデル」→「多変量時系列」→「共和分検定 (Johansen)」を選択。
- (b) 「ラグ次数」を入力。
- (c) 「検定する変数」を選択。
- (d) 「外生変数」は選択しない。
- (e) 定数項・トレンドの扱いを選択。
- (f) その他は必要に応じて設定（基本的にデフォルト値のままでよい）。
- (g) 「OK」をクリック。

前問と同じデータを用いて Johansen の共和分検定を実行しなさい。ただし前問との整合性からラグ次数を 4 とし、制約付きのトレンドを仮定する。

解答例

1. (a) VAR(4) モデル

VAR モデル, ラグ次数: 4

最小二乗法 (OLS) 推定量, 観測: 1954-1985 ( $T = 32$ )

Log-likelihood = 209.775

共分散行列の行列式の値 = 6.93501e-009

AIC = -11.8609

BIC = -10.9448

HQC = -11.5573

かばん検定 (Portmanteau test): LB(8) = 31.3529, df = 16 [0.0121]

方程式 1: L.Y

	係数	標準誤差	t-ratio	p 値
const	2.52564	1.41644	1.783	0.0884
L.Y_1	0.429741	0.375724	1.144	0.2650
L.Y_2	0.762910	0.398567	1.914	0.0687
L.Y_3	0.926422	0.422392	2.193	0.0391
L.Y_4	-0.549537	0.348011	-1.579	0.1286
L.C_1	0.653392	0.400788	1.630	0.1173
L.C_2	-0.746474	0.443556	-1.683	0.1065
L.C_3	-0.982556	0.485654	-2.023	0.0554
L.C_4	0.109262	0.456989	0.2391	0.8132
time	0.0132458	0.00757703	1.748	0.0944
Mean dependent var	7.357680	S.D. dependent var	0.323740	
Sum squared resid	0.005128	S.E. of regression	0.015268	
$R^2$	0.998422	Adjusted $R^2$	0.997776	
$F(9, 22)$	1546.200	P-value( $F$ )	1.09e-28	
$\hat{\rho}$	0.135750	Durbin-Watson	1.597093	

ゼロ制約の F 検定

All lags of L.Y  $F(4, 22) = 3.43906$  [0.0250]

All lags of L.C  $F(4, 22) = 4.34541$  [0.0097]

All vars, lag 4  $F(2, 22) = 2.96927$  [0.0722]

方程式 2: LC

	係数	標準誤差	t-ratio	p 値
const	4.02518	1.40763	2.860	0.0091
LY_1	0.200009	0.373389	0.5357	0.5976
LY_2	0.929567	0.396090	2.347	0.0283
LY_3	0.502951	0.419767	1.198	0.2436
LY_4	-0.199634	0.345848	-0.5772	0.5696
LC_1	0.794861	0.398297	1.996	0.0585
LC_2	-1.15497	0.440799	-2.620	0.0156
LC_3	-0.567545	0.482635	-1.176	0.2522
LC_4	-0.143471	0.454148	-0.3159	0.7550
time	0.0210867	0.00752994	2.800	0.0104
Mean dependent var	7.258948	S.D. dependent var	0.318996	
Sum squared resid	0.005065	S.E. of regression	0.015173	
$R^2$	0.998394	Adjusted $R^2$	0.997738	
$F(9, 22)$	1520.018	P-value( $F$ )	1.31e-28	
$\hat{\rho}$	0.001383	Durbin-Watson	1.953720	

ゼロ制約の F 検定

All lags of LY	$F(4, 22) = 2.38769$	[0.0820]
All lags of LC	$F(4, 22) = 4.57647$	[0.0077]
All vars, lag 4	$F(2, 22) = 1.12695$	[0.3420]

連立方程式全体に関して —

帰無仮説: 最長のラグは 3 である

対立仮説: 最長のラグは 4 である

尤度比検定:  $\chi_4^2 = 10.400$  [0.0342]

(b) VECM

ベクトル誤差修正モデル (VECM), ラグ次数: 4

最尤法 推定値, 観測: 1954-1985 (T = 32)

共和分ランク = 1

ケース 4: 制約付きのトレンド, 制約のない定数項

beta (共和分ベクトル, 丸括弧内は標準誤差)

```
l_Y      1.0000
          (0.00000)
l_C      -1.3739
          (0.068647)
trend    0.012286
          (0.0024168)
```

alpha (adjustment vectors)

```
l_Y      0.91339
l_C      1.6245
```

Log-likelihood = 207.95699

共分散行列の行列式の値 = 7.7694513e-009

AIC = -11.8723

BIC = -11.0478

HQC = -11.5990

方程式 1: d\_l\_Y

	係数	標準誤差	t 値	p 値
const	2.14802	1.39220	1.543	0.1365
d_l_Y_1	- 1.36705	0.580414	- 2.355	0.0274 **
d_l_Y_2	- 0.551470	0.442509	- 1.246	0.2252
d_l_Y_3	0.434638	0.324999	1.337	0.1942
d_l_C_1	1.83261	0.693707	2.642	0.0146 **
d_l_C_2	1.01524	0.572267	1.774	0.0893 *
d_l_C_3	- 0.0506523	0.461823	- 0.1097	0.9136
EC1	0.913390	0.595371	1.534	0.1386

Mean dependent var 0.032741 S.D. dependent var 0.018413

Sum squared resid	0.005599	回帰の標準誤差	0.015602
R-squared	0.467300	Adjusted R-squared	0.282013
rho	0.175823	Durbin-Watson	1.559707

方程式 2: d\_l\_C

	係数	標準誤差	t 値	p 値	
const	3.82846	1.34309	2.850	0.0091	***
d_l_Y_1	- 1.35951	0.559941	- 2.428	0.0234	**
d_l_Y_2	- 0.400598	0.426900	- 0.9384	0.3578	
d_l_Y_3	0.135610	0.313534	0.4325	0.6694	
d_l_C_1	1.98459	0.669237	2.965	0.0069	***
d_l_C_2	0.790110	0.552081	1.431	0.1658	
d_l_C_3	0.176130	0.445532	0.3953	0.6962	
EC1	1.62449	0.574370	2.828	0.0095	***


Mean dependent var	0.033075	S.D. dependent var	0.016820
Sum squared resid	0.005211	回帰の標準誤差	0.015052
R-squared	0.405855	Adjusted R-squared	0.199196
rho	0.023442	Durbin-Watson	1.920117

Cross-equation covariance matrix:


	l_Y	l_C
l_Y	0.00017497	0.00014395
l_C	0.00014395	0.00016284

行列式の値 = 7.76945e-009

(c) VAR(4)



VECM



## 2. Johansen の共和分検定

Johansen 検定:

式の数 = 2

ラグ次数 = 4

推定期間: 1954 - 1985 (T = 32)

ケース 4: 制約付きのトレンド, 制約のない定数項

Log-likelihood = 300.587 (定数項を含む: 209.775)

ランク	固有値	トレース検定	p 値	最大固有値検定	p 値
0	0.32004	15.979	[0.5022]	12.343	[0.3963]
1	0.10740	3.6358	[0.7891]	3.6358	[0.7909]

標本のサイズに合わせて修正した検定 (df = 22)

ランク トレース検定 p 値

0	15.979	[0.5664]
1	3.6358	[0.7982]

固有値 0.32004 0.10740

beta (cointegrating vectors)

l_Y	215.86	-89.665
l_C	-296.57	75.240
trend	2.6521	0.52767

alpha (adjustment vectors)

l_Y	0.0042314	0.0038349
l_C	0.0075257	0.0021369

renormalized beta

l_Y	1.0000	-1.1917
l_C	-1.3739	1.0000
trend	0.012286	0.0070132

renormalized alpha

l_Y	0.91339	0.28854
l_C	1.6245	0.16078

long-run matrix (alpha \* beta')

	l_Y	l_C	trend
l_Y	0.56954	-0.96638	0.013246
l_C	1.4329	-2.0711	0.021087