

中級統計学：復習テスト 18

学籍番号 _____ 氏名 _____

2023 年 12 月 4 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない。正答に修正した上で、復習テスト 14～20 を順に重ねて左上でホチキス止めし、第 3 回中間試験実施日（12 月 15 日の予定）に提出すること。

1. $\text{Bin}(1, p)$ から抽出した大きさ n の無作為標本を (X_1, \dots, X_n) とする。

(a) $(X_1, \dots, X_n) = \boldsymbol{x}$ の確率を求めなさい。

(b) $(X_1, \dots, X_n) = \boldsymbol{x}$ を観測したときの p の尤度関数を書きなさい。

(c) $(X_1, \dots, X_n) = \boldsymbol{x}$ を観測したときの p の対数尤度関数を書きなさい。

(d) (対数) 尤度最大化の 1 階の条件を導きなさい。

(e) p の ML 推定値と ML 推定量を求めなさい。

2. $N(\mu, \sigma^2)$ から抽出した大きさ n の無作為標本を (X_1, \dots, X_n) とする.

(a) $(X_1, \dots, X_n) = \mathbf{x}$ の確率密度を書きなさい.

(b) $(X_1, \dots, X_n) = \mathbf{x}$ を観測したときの (μ, σ^2) の尤度関数を書きなさい.

(c) $(X_1, \dots, X_n) = \mathbf{x}$ を観測したときの (μ, σ^2) の対数尤度関数を書きなさい.

(d) (対数) 尤度最大化の 1 階の条件を導きなさい.

(e) (μ, σ^2) の ML 推定値と ML 推定量を求めなさい.

解答例

1. (a) X_1, \dots, X_n は独立なので

$$\begin{aligned}\Pr[(X_1, \dots, X_n) = \mathbf{x}] &= \Pr[(X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n)] \\ &= \Pr[X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n] \\ &= \Pr[X_1 = x_1] \cdots \Pr[X_n = x_n] \\ &= p^{x_1} (1-p)^{1-x_1} \cdots p^{x_n} (1-p)^{1-x_n} \\ &= p^{x_1 + \cdots + x_n} (1-p)^{(1-x_1) + \cdots + (1-x_n)} \\ &= p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}\end{aligned}$$

(b)

$$L(p; \mathbf{x}) = p^{\sum_{i=1}^n x_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n x_i}$$

(c)

$$\ell(p; \mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n x_i \ln p + \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) \ln(1-p)$$

(d) 1 階の条件は

$$\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^*} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{1-p^*} = 0$$

すなわち

$$(1-p^*) \sum_{i=1}^n x_i - p^* \left(n - \sum_{i=1}^n x_i \right) = 0$$

(e) ML 推定値は

$$p^* = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

ML 推定量は

$$\hat{p} = \bar{X}$$

2. (a) X_1, \dots, X_n は独立なので

$$\begin{aligned}f_{X_1, \dots, X_n}(\mathbf{x}; \mu, \sigma^2) &= f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n; \mu, \sigma^2) \\ &= f_{X_1}(x_1; \mu, \sigma^2) \cdots f_{X_n}(x_n; \mu, \sigma^2) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_1 - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \cdots \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{(x_1 - \mu)^2}{2\sigma^2} - \cdots - \frac{(x_n - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) \\ &= (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)\end{aligned}$$

(b)

$$L(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = (2\pi)^{-n/2} (\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

(c)

$$\ell(\mu, \sigma^2; \mathbf{x}) = -\frac{n}{2} \ln 2\pi - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

(d) 1 階の条件は

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sigma^{2*}} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu^*) &= 0 \\ -\frac{n}{2\sigma^{2*}} + \frac{1}{2\sigma^{2*2}} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu^*)^2 &= 0\end{aligned}$$

すなわち

$$\begin{aligned}\sum_{i=1}^n (x_i - \mu^*) &= 0 \\ -n\sigma^{2*} + \sum_{i=1}^n (x_i - \mu^*)^2 &= 0\end{aligned}$$

(e) ML 推定値は

$$\begin{aligned}\mu^* &= \bar{x} \\ \sigma^{2*} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\end{aligned}$$

ML 推定量は

$$\begin{aligned}\hat{\mu} &= \bar{X} \\ \hat{\sigma}^2 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2\end{aligned}$$